



**Campagne Agricole : 2017 / 2018**

Mois de : Janvier 2018

Période : du 22 au 27.01.2018

**1. Situation actuelle :**

**1.1 Situation climatique du : 14 au 20.01.2018**

➤ **Températures (°C):**

Régions	Ouest			Centre			Est		
	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy	T° moy. Min.	T° moy. Max.	T° Moy
Littoral	8.9	16.5	12.7	8.3	17.4	12.8	8.4	17.8	13.1
SubLittoral	5.8	16.7	11.2	6.4	14.6	10.5	4	17.7	10.9
Hauts plateaux	2.6	13.5	8	3.2	14.1	8.7	2.3	14	8.2

**Observations :** Les températures moyennes ont été en **hausse** au sur l'ensemble des régions (écart de 02 à 04°C);

Avec : Littoral : minima : 04 à 09°C

maxima : 15 à 18°C

Hauts plateaux : minima : 02 à 03°C

maxima : 13 à 14°C

➤ **Pluviométrie (mm) :**

Régions	Ouest	Centre	Est
Littoral	01-22	00-02	00-15
Sub Littoral	03-11	02-12	-
Hauts Plateaux	00-16	00-01	00-04

**Observations :** Gelées au niveau des Hauts plateaux.

• **Température minimale (°C) :**

STATIONS	14-janv	15-janv	16-janv	17-janv	18-janv	19-janv	20-janv
EL BAYADH	0	1	-3	-2			
MECHRIA			-2	-2	-1		
AIN SEFRA			0	-1	-1		
NAAMA			0	-3	1		
TIARET			-1	1	0		
DJELFA			0	1	0		
SETIF	0	0	-1		0		
CONSTANTINE		0	0				
O.E. BOUAGHI	1	-1	-2			-1	
BATNA	-2	0		-3	-2	-1	
TEBESSA	-1		-3	-2		-2	

**Impacts agrométéorologiques de la décade :**

- Evapotranspiration saisonnière;
- Manifestation des mauvaises herbes sur l'ensemble des régions.

## Prévisions :

### Lundi 22 janvier 2018

**Ouest et Centre** (littoral, intérieur et les hauts plateaux): Temps généralement dégagé.

Les vents seront d'Ouest à Sud-Ouest 20/30 km/h près des côtes et variables à Nord-Ouest autour de 20 km/h sur l'intérieur et les hauts plateaux.

**Régions Est** (littoral, intérieur, hauts plateaux et Aurès): Passages nuageux en matinée suivis de larges éclaircies l'après-midi. Les vents seront d'Ouest à Nord-Ouest 20/30 km/h atteignant parfois 40 km/h près des côtes.

**Les régions sahariennes:** Temps généralement dégagé.

Les vents seront variables faibles sur le Nord Sahara et les oasis. Ailleurs, ils seront d'Est à Nord-Est 20/30 km/h.

### Du mardi 23 au jeudi 25 janvier 2018

#### Régions Nord :

Excepté quelques nuages bas en matinée près des côtes Est, le temps sera généralement dégagé.

**Les températures maximales :** régions côtières et proches côtières: entre 16°C et 20°C. **Vers l'intérieur, les hauts plateaux et les Aurès:** entre 12°C et 20°C.

**Les températures minimales:** Avoisineront zéro degré en fin de nuit et début de matinée sur les hauts plateaux de l'Ouest.

**Les vents** seront généralement faibles à modérés.

#### Régions Sud :

Excepté quelques nuages bas sur les oasis le jeudi, le temps sera dégagé à partiellement voilé durant la validité.

**Les températures maximales:** de la région de Béchar vers le Nord Sahara, les oasis, le Hoggar/tassili et le Sahara oriental: entre 16°C et 22°C. **Sur les autres régions sahariennes:** entre 22°C et 24°C atteignant 26°C sur l'extrême Sud.

**Les vents** seront faibles à modérés avec quelques soulèvements de sable locaux sur le Sahara central et l'extrême Sud durant la validité.

## Impacts agrométéorologiques prévisionnels :



- Légère hausse de l'évapotranspiration;
- Risque de gelées au niveau des Hauts plateaux Ouest;
- Conditions favorables pour le développement des mauvaises herbes;
- Ralentissement de la croissance végétative au niveau des hauts plateaux;
- Risque de brûlure sur les fruits d'agrumes à cause des gelées.

## 1.2- Stade et comportement de la végétation:

### 1.2.1-Arboriculture :

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
Agrumes	Centre	Véraison à maturité	-	
	Est	//	-	
	Ouest	//	-	
Oliviers	Centre	Prématurité à maturité	-	
	Est	//	-	
	Ouest	//	-	
Néflier	Centre	Nouaison à début grossissement	-	
	Est	//	-	
	Ouest	//	-	
Rosacées à noyaux Pêcher Amandier Abricotier	Centre	Débourrement à floraison (Var. Précoces)	-	
	Est	//	-	
	Ouest	//	-	

### 1.2.2-Cultures maraichères:

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
Ail	Centre	-	-	 L'oignon sec est en pépinière ;  Poursuite plantation de la pomme de terre saison à l'Ouest (Mostaganem)
	Est	5 feuilles	-	
	Ouest	-	-	
<u>Culture S/serre</u> Tomate	Centre	Développement	-	3 à 4 <sup>ème</sup> bouquet au niveau de la région d'Achaacha
	Est	-	-	
	Ouest	Développement	-	
Piment et poivron	Centre	//	-	-
	Est	-	-	
	Ouest	Développement	-	

### 1.2.3-Grandes cultures:

Spéculations	Régions	Littoral et Sub - littoral	Hauts plateaux	Observation
Blé	Centre	Début à plein tallage	3 à 4feuilles	-
	Est	//	//	
	Ouest	//	//	
Orge et Avoine	Centre	Début à plein tallage	Début tallage	-
	Est	//	//	
	Ouest	//	//	

### 1.3- Recommandations techniques :

#### 1.3.1-Arboriculture :

Spécifications	Risques	Recommandations	Observations
<u>Agrumes</u>	Gommose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poursuite récolte des variétés de saison;</li> <li>• Ramassage et incinération des fruits infectés par cératites.</li> </ul>	<b>Respect du DAR ;</b>
<u>Oliviers</u>	Tuberculose	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poursuite récolte des olives à l'huile.</li> </ul>	Poursuite de la taille pour l'ensemble des espèces ;
<u>Vigne</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déchaussage;</li> <li>• Remise en état du palissage.</li> </ul>	Masticage des plaies ;
<u>Rosacées à pépins</u> Pommier Poirier Néflier	Tavelure	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveillance et traitement contre risque.</li> </ul>	Ramassage et élimination du bois de la taille.  Poursuite des traitements de l'hiver.
<u>Rosacées à noyaux</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traçage et piquetage pour les nouvelles plantations</li> </ul>	<b>Discaje contre les mauvaises herbes.</b>
<u>Plantations 2017/2018</u>			

#### 1.3.2-Cultures maraichères :

Spécifications	Risques	Recommandations	Observations
Culture sous serre	Mildiou Mineuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surveillance et traitement contre risques ;</li> <li>• Respect des mesures prophylactiques ;</li> <li>• Palissage de la tomate sous serre.</li> </ul>	-

#### 1.3.3-Grandes cultures :

Spécifications	Risques	Recommandations	Observations
Céréales Orge et Avoine	Mauvaises herbes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Début des opérations de désherbage et de fertilisation azotée.</li> </ul>	-
Légumineuse alimentaire	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poursuite des opérations de semi des légumineuses alimentaires.</li> </ul>	-

#### 1.3.4-Phœniciculture :

Spécifications	Risques	Recommandations	Observations
Palmier Dattier	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entretien des palmeraies (désherbage, taille des palmes sèches, curage des drains).</li> </ul>	-

### 1.3.5-Production animale:

Filières	Recommandations
<b>Apiculture</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prévenir les pertes des ruches par inondation en évitant les terrains enfoncés;</li><li>• Traitement anti varroa pour les retardataires ;</li><li>• Nourrissement massif des colonies;</li><li>• Poursuite récolte du miel;</li><li>• Enlèvement des hausses;</li><li>• Réunion des colonies faibles;</li><li>• Orientation des ruches vers le Sud-Est;</li><li>• Eviter de placer les ruches dans des zones inondables;</li><li>• Désherbage autour des ruches;</li><li>• Lister les ruches avec des pierres ;</li><li>• Préparation des colonies à l'hivernage.</li></ul>
<b>Aviculture</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Procéder toujours à un nettoyage du bâtiment d'élevage à chaque renouvellement de la bande ;</li><li>• Respect du vide sanitaire après le départ des volailles ;</li><li>• Campagne de vaccination en cours;</li><li>• Faire contrôler l'efficacité de la désinfection en faisant appel au vétérinaire.</li></ul>
<b>Ruminants</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avoir un registre au niveau de l'étable des interventions faites par le vétérinaire;</li><li>• Surveiller particulièrement l'état sanitaire des animaux et détecter tous symptômes respiratoires ;</li><li>• Assurer une alimentation équilibrée et énergétique, pour le ovins (fourrages-orges) et pour les bovins (fourrages-concentré) ;</li><li>• Ne pas introduire de nouveaux animaux au niveau de l'exploitation sans avis du vétérinaire;</li><li>• Mettre en place des pédiluves à l'entrée des étables;</li><li>• Déclaration obligatoire au vétérinaire en cas de mort d'un animal;</li><li>• Poursuite de la campagne de vaccination anti brucellique pour les ovins et les caprins ;</li><li>• Vermifugation des animaux de 3 à 4 semaines avant toute vaccination ;</li><li>• La contention des animaux doit être parfaite et toute personne doit porter le nécessaire pour sa protection (tablier, lunettes et gants).</li></ul>