

جانفي

مذکرات

محاصيل الخضر

المحاصيل الحقلية

- البطاطس

المبكرة

- * العلاج الكيماوي ضد طفيليات التربة ،
النطاط ، الديدان البيضاء ، البياض الزغبي ،
المن .

* تسميد العناية : 150 وحدة أزوت ، 200
وحدة بوتاس /هـ

* العزق - التحضين

* الري حسب الضرورة

الموسمية

* التتعيم بالقرص

* التخطيط .

المتأخرة

* نهاية الجني

* تنظيف الحقل .

الطماطم

المبكرة

* التسنيد

* العلاجات الكيماوية ضد البياض الزغبى

والالترناريا

* الري حسب الضرورة

الموسمية

* الحرث

* التنعيم القرصي

* تطهير التربة من النيماطودا

* إعداد المشتل

* العناية

المتأخرة

* نهاية الجمع

* تنظيف الحقل

الفلل الحار والحلو

المبكر

* إعداد المشتل

* البذر : 1,2 كجم/هـ

* العناية .

المتأخر

* نهاية الجني

* تنظيف الحقل .

الباذنجان

المبكر

* العناية بالمشتل

* الزراعة : 0,5 كجم/هـ

* الري عن طريق الرش

* تسوية التربة

* التخطيط

* التسميد : 40 وحدة أزوت ، 100 وحدة

فوسفور ، 60 وحدة بوتاس/هـ

البصل غير المسقي

* التنعيم ، التسوية في النصف الاول

* إضافة الاسمدة : 60 وحدة أزوت ، 130

وحدة فوسفور ، 130 وحدة بوتاس/هـ

* التخطيط

* الغرسة في النصف الثاني .

- الثوم المسقي

* العزق

* إزالة الحشائش يدويا في النصف الاول

- القنبيط

* الجني

* تنظيف التربة .

- القرعة

المبكرة

* البذر مباشرة الى منتصف الشهر :

3,5 كجم/هـ

* من نصف جانفي العناية الزراعية : العزق ،

الخف

* العلاج الكيماوي ضد البياض الدقيقي .

الموسمية

* ابتداء من نصف جانفي : الحرث ، التنعيم ،

الخربشة .

- الجرز

- * إعداد التربة : حرث متقاطع وتنعيم ثم نثر
الأسمدة خلال النصف الاول من الشهر
- * البذر في النصف الثاني : 4 - 5 كجم / هـ

- الكرنب

- * الجني
- * التنعيم القرصي لتنظيف الحقل .

- البسباس

- * الجني

- الكراث

- * إعداد التربة
- * التنعيم القرصي
- * التخطيط
- * العناية بالمشتل
- * الغرسة بعد تهيئة النباتات والري في نهاية
الشهر .

- الكرفس

- * إعداد التربة : الحرث ، سماد العمق (30 طن زبل/هـ)
- * إعداد ظهر الخطوط
- * العناية بالمشتل ، إزالة الحشائش ، الخف
- * الغرسة والري اليدوي .

- الخرشف البري

- * البذر + الترصيص : 7 - 8 كجم/هـ
- * الخف
- * العزق + التحضين
- * الري + العلاجات (حسب الضرورة)
- * بداية التبييض في النصف الثاني من الشهر .

- الهندباء

إنتاج الشتاء

- * التبييض
- * الري حسب الضرورة
- * الحماية الكيماوية
- * الجني .

- الخرشوف المبكر

* الجني

- البازلاء

مبكرة غير مسقية

* في طور الانتاج الكلي .

مبكرة مسقية

* نهاية الانتاج

* تنظيف القطع

الموسمية

* تحضير التربة

* سماد العمق : 30 وحدة أزوت ، 100 وحدة

فوسفور، 40 وحدة بوتاس /هـ

* سماد التغطية : 30 وحدة أزوت ، 40 وحدة

بوتاس /هـ

* البذر : 100 - 120 كجم /هـ (بذر ديسمبر)

* العزق - التحضين + إضافة الأزوت .

- الفول

المبكر (الساخلي)

* الانتاج

الموسمي

* العناية بالمحصول : العزق ، إزالة الحشائش

الموسمي (الجنوب)

* العناية بالمحصول ، عزق ، إزالة الحشائش

المتأخر (الهضاب العليا)

* العناية بالمحصول .

- الفراولة

الفراولة الباردة (في العراء فوق رقائق البلاستيك)

* الري حسب الضرورة

* العلاج الكيماوي ضد الفطريات العنقودية .

الفراولة الطرية (في العراء فوق رقائق البلاستيك)

* الري حسب الضرورة

* العلاجات الكيماوية

* إزالة الحشائش (يدويا) .

المحاصيل داخل البيوت البلاستيكية

- الطماطم

* علاج الاوراق من البياض الزغبي ، الالترناريا

والفطر العنقودي والمن

* تسميد العناية : 130 وحدة أزوت /هـ

* إزالة الحشائش يدويا

* الري .

- اللوبيا المسندة (الفاصولية المسندة)

* الري

* تعويض الناقص

* العزق والتحصين

* التسنيد (القصب)

- الفلفل الحلو والحر

* الري

* العلاجات الوقائية ضد البياض الزغبي ،

الريزوكتونيا والمن

* إزالة الحشائش

- الخبار

* الري

* العلاج الوقائي ضد القرديات ، المن ، البياض

الدقيقي ، الدوارة ، سكليرتينا ، الفطر العنقودي

* وضع الاسمدة المعدنية + عزق وتكويم

* إقامة السنادات .

المحاصيل داخل الانفاق الصغيرة

- الفلفل الحار - الطوم - البالدنجان

* الري السابق للغرسة

* التغطية

* الغرسة

* الري حسب الضرورة .

- القرعة

* الري حسب الضرورة

* العلاج الوقائي ضد البياض الدقيقي

* تسميد العناية المعدني : 30 وحدة أزوت ،

100 وحدة فوسفور 40 وحدة بوتاس /هـ

* العزق - التحضين بعد التسميد مباشرة .

المحاصيل الصناعية

- الشمندر السكري

* البذر

* العزق الاول

* الخف

* الاضافة الثانية للأزوت : 100 وحدة/هـ

- الطماطم الصناعية

* البذر في المشتل : سان مارزانو ، هنز روما

VF روف ST

- القطن

* تحضير التربة

- التبغ

* تحضير التربة

* نثر سماد العمق : 100 وحدة أزوت ، 184

وحدة فوسفور 22 وحدة بوتاسيوم/هـ

- عباد الشمس

* إعداد مهد البذور

* البذر الآلي أي الدقيق : 15 كجم/هـ

S 37 S 400

- القرطم

* إعداد مهد البذور

* البذر الآلي أي الدقيق : 15 كجم/هـ

S 317 S 400

- الذرة

* تطهير التربة (تكملة)

* الحرث المتقاطع

المحاصيل الكبرى

الحبوب الشتوية

- القمح

* إضافة أزوت التغطية عند التفريع 33

وحدة/هـ

الخضر الجافة

- العدس - الفول

* تكملة إعداد مهد البذور

* متابعة البذر

الأعلاف

- البرسيم غير المسقي

* الحشة الاولى

- النسيلة الايطالية (الزوان)

* الحشة الاولى

* إضافة الأزوت : 33 وحدة/هـ

- البرسيم الحجازي

* تسميد العناية والتكشير (العام الثاني ،

الثالث ، الرابع)

البورد المخدم

* الحرث العميق

أشجار الفاكهة

- الورديات البذرية : التفاح ، الكمثري ، السفرجل ،
المان ، البشملة

* العلاج ضد التبقع في نهاية التزهير أو بداية
العقد في البشملة

* تكملة الغراسة ، التوتيد ، وفتح الجور

* تكملة علاجات الشتاء

* تكملة التقليم السنوي

* المقاومة الكيماوية للحشائش في الغراسات
المثمرة

* التوتيد وحفر الجور للبشملة .

- الورديات ذات النواة الحجرية : المشمش ، الخوخ ،
البرقوق ، الكرز ، اللوز

* تكملة الغراسة (بون اللوز)

* تكملة التقليم

* نثر الأزوت في اللوز بكمية : 90 وحدة/هـ

* علاج الشتاء (نهايته)

* العلاجات قبل التزهير في اللوز ضد

الكورنيوم والتجعد

- الزيتون

- * تكملة جني زيتون الزيت
- * تكملة التقليم السنوي : (إزالة حطب التقليم ، خطر الكراشة) (قطع البلوط)
- * تكملة الغراسة ، التوتيد وفتح الجور
- * طلب الاسمدة الأزوتية (تذكير)

- الحوامض

- * نهاية جمع الكلمنتين وتكملة جمع الصيفي ، الحوامض العادية ، الليمون ، الليمون الحلو وبداية المندرين
- * تكملة التقليم في العادي ، الليمون ، الليمون الحلو وبدايته في المندرين
- * طلب السماد الأزوتي إن لم يتم ذلك بعد .

الكروم

- الكرمة المنتجة

- * تكملة التقليم
- * جمع الاحطاب

- * مراقبة حالة الدعامات
- * مراقبة السلك
- * العلاج الشتوي ضد الحلزونات
- * نهاية حرث كشف الجذور
- * العزق حول الارومات .

- الكرمة الجديدة

- * إستقبال النباتات
- * وضع النباتات في الوديان
- * إعداد الجور للغراسات الجديدة
- * الغرسة
- * تعويض الناقص للغراسات السابقة .

ملحوظة :

يعتبر شهر جانفي من أكثر الشهور برودة وأكثر أمطارا وتكون الكرمة في طور الراحة وهذا هو الوقت الملائم لاجراء العمليات الحقلية وعمل علاجات الشتاء ضد الاسكا .

والمبيدات المستعملة هي مبيدات سامة بالنسبة للانسان كما هي الحال بالنسبة للنبات ، يتم العلاج ما بين 20

ديسمبر الى 20 جانفي أو أكثر تأخيرا قبل أن تدخل
النباتات في طور النشاط ويستعمل أرسونات الصودا
1350 كجم لحامض الارسينو ويجب غسل الأرومات
جيدا أو تبليلها جيدا ويستعمل 1000 لتر/هـ في عملية
الرش .

أثناء العلاج يوصي بعدم التدخين واستعمال الكمّات،
كذلك لباس بذلة العمل والاغتسال جيدا بعد العمل . يعاد
العلاج ضد الاسكا كل 3 سنوات .